n.° 53. Observation dun perioste ossifie par une Contusion, avec Carie au tibia 1.er

Le 13 8.bre 1751, Le Sieur dumoulin ~~garçon~~ chirurgien de L'hopital de la marine de ce port, Recut un Coup de baston sur la partie moyenne anterieure de la jambe droite, qui luy fit une playe transuersalle Longue d'un peut plus d'un pouce qui découvrit le perioste qui fut Contu par le Coup; il Reçu le coup le Soir, un de ses Camarade y fit un poin de Suture Et Le pensse a Sa fantaisie; Le Landemain au matin Lon me dit quil Setoit donné la jambe Contre un Cofre Sans me dire autre chose; je fus le voir, je trouvay du Gonflement, je le fis Seigner Et pansser avec un plumasseau Légerement garni de digestif, un Emplastre de Stirax Et des Compresses d'Eau de vie; Le Soir il fut reseigné. Le 15 Le gonflement ayant ogmenté Et Estant Survenu de Linflamation, il fut Reseigné, Lon lachá le poin de Suture qui Etoit Empartie déchiré, Lon Couvrit tout le gonflement d'un Cataplasme anodin. Le 16 la playe Se déslabra, Elle Etoit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC C. 39 n° 159

garnie de chairs molaces baveuses, Et boursoufflée, Sans diminution au gonflement, ni a la rougeur de la jambe; il fut Resaigné, même pensement.
Le 17.e Le gonflement ayant ogmenté ainsy que la playe, il fut resaigné; La Supuration a mesure que Lulcere ogmentoit devenoit de plus En plus ténasse Et gluante; Lon bassinoit la playe avec de Lesprit de vin Camphré auquel je fis ajouter le Sel amoniac; Lon couvrit les plumasseaux de digestif animé, toucela inutillement; Les chairs Se boursoufflroient Et ogmentoient a mesure que Lulcere Setendoit; Lon Etoit obligé denlever cette Espece de morue ténace, avec une feuille de mirthe; cette Espece de pourriture gagnoit Sous la peau dans le tissus celulaire de la graisse par En haut Et par Embas, Lon avoit Soing douvrir la peau a mesure que lon trouvoit du vuide, ce qui ogmentoit LEtendüe de Lulcere; je fis pensser avec un onguent fait avec Le mondificatif dache, Lalun Calciné Et le précipité rouge; mais il Sembloit qua mesure que cet onguent détruisoit la surface des chairs de Lulcere, elle

de dessous n'en poussoient qu'avec plus de vigueur Et d'une plus mauvaise qualité; je changay de battrie Et j'employé le digestif avec L'Egipciac, Ensuitte L'Egipciac pur, mais tou cela jnutillement, La pourriture Et L'ulcere ogmentoient toujours. Le 25 on Reconnut vne tumeur a la partie superieure interne de la jambe; deux jours apres L'on y reconnut du pus, L'on L'ouvrit, la purulance qui En Sortit Etoit semblable a celle de L'ulcere, je pansé que cette malignité Et le boursouflement, ne venoit que des vaiss.t qui forme les chairs dont les playes sont formées, qui Estoient trop Relachées, qui poussoient avec trop de vigeurs Et qui formoient par leurs vegetations hireguliercs, la mauvaise qualité de la Supuration; En Consequance, je fis faire vne decoction de Roses Séche, de baloste Et de plantin dans du vin Rouge, a laquelle je fis ajouter vn gros d'alun crud par pinte pour luy donner vne qualité plus Stiptique; je fis bassiner la playe avec cette decoction Et la fis pensser avec des plumasseaux trempé dans la même

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Liqueur ainsy que les Compresses, Sans onguent ny
Emplastre, ce qui reussit au mieux Et Remplit
au par fait mon jndilation, Car, de ce moment, le
gonflement diminué, les chairs Se recevrerent le
pus devient moins ténace Et plus Coulent, Lulcere
Se nétoyá Et les chairs devienrent belle Et de bonne
qualité; mais lors que Lulcere commensa a Se
nétoyer, il se trouva vne partie osseuse qui Se
découvroit de plus En plus a mesure que la playe
se nétoyoit, de maniere que le 4 9.bre il y En avoit
trois pouce de long de découvert Et de la Largeur
dun demi pouce, Lon panssá lós decouvert avec
Lesprit de vin, Et le Reste avec La fommentation
Si dessus. Le 10 9.bre lón tira trois petites piesses dós
qui avoient au moins deux Lignes d'Epaisseur, pour
Lors je maperceu que Cetoit le periostе qui Setoit
ossifié, le Corps du tibia Se trouvant a découvert
par dessous Et que le gonflement qui occupoit
toute la partie anterieure Et interne de la jambe
Cest a dire toute La face interne du ~~cotez~~ tibia, du depuis
Sa tuberosité jus-qu'a sa partie inferieure,
Et du depuis Sa creste jus-qu'á Son angle interne,

n'étoit autre choses que le perioste gonflé Et devenu osseux. il se fit un dépost a la partie moyenne interne que Lon ouvrit le 19 où l'os se trouvá découvert, anfin En suivant la maladie du perioste lon fut obligé a divers reprises, de découvrir le tibia de la Longueur de 8 pouce; pour le découvrir je fis Emporter a divers fois, une partie du perioste ossifié avec une Rugine Et je fis tomber En diverse parties les bords avec Le Consomptif mêle avec Le digestif pour me rendre maitre de son Effet Et Eviter au malade une trop grande douleur. il se forma un dépost a la partie moyenne Externe qui fut ouvert le 12 7.bre Le 12 jenvier 1752 on tira a la partie superieure, une Esquille du perioste, Longue d'un pouce large d'environ deux Lignes. Le 20 l'on En détachá une autre a la partie inferieure, Large Comme un denier Et un peu ovalle. Le 17 fevrier je fis perforer Le tibia qui se trouva carié jus-qu'au Canal; Le 18 l'on appliquá un trepan Exph

oliatif Et le 19 deux autres, pour diminuer de L'Epaisseur de la Carie. Le 24 on tira de la partie inferieure, un morceau du perioste

~~Large~~ Long dun demy pouce; ~~je fis appliquer~~ le 2 mars lon Enleua de
la partie inferieure vn autre morceau osseux de
meme ~~meme~~ Longueur. je fis appliquer le feu a trois
differente fois; Lon toucha Los aussi trois fois, auec
la dissolution de mercure dans Lesprit de nitre.
Le 26 may la piece du tibia Se détacha, de la
Longueur de 7 pouce Edemy. il Resta a la partie
inferieure, vne portion du perioste ossifié, qui
formoit vne Espece de voute qui Couvroit la partie
inferieure de la grande Esquille. Le 28 juin le
Reste du perioste Se détacha. Le vuide Se
Remplit de bonnes chairs Et La playe finit de
Se Sicatriser Le 10 novembre 1752. La cure
de Cette grande playe a donc duré treze mois
moins trois jours.

Le vuide de la deperdition de Substance du tibia,
Sest Rempli de chairs qui Endevenant Solide,
ont presque Reparé tout le vuide Laissé par la
Sortie de la grande Esquille, de maniere que ce
chirurgien, a autant de force dans cette jambe
que dans Lautre; il a fait du depuis deux
Campagne, aux Colonnies, pour Le Roy.

La partie blanche de Lesquille Est Sa partie
inferieure qui Etoit Recouverte par vne Espece
de vouste formée par le periost offifié; Son bord
le plus Epais formoit La Creste, Et Le plus mince
Son angle interne. a Rochefort Le 15.e Juillet
1756

Lahaye

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE